

Champignons à lamelles :

- Agaricus campestris* : Agaric champêtre
- Agaricus sylvicola* : Agaric anisé des bois
- Aleuria aurantia* : Pézize orangé
- Amanita citrina* : Amanite citrine
- Amanita crocea* : Amanite safran
- Amanita excelsa* : Amanite élevée
- Amanita franchetii* : Amanite à voile jaune
- Amanita muscaria* : Amanite tue-mouche
- Amanita rubescens var. annulosulfurea* : Golmotte à anneau soufré
- Amanita rubescens* : Amanite rubescens, Golmotte
- Amanita spissa* : Amanite épaisse
- Amanita vaginata* : Amanite engainée, Grisette
- Armillaria mellea* : Armillaire couleur de miel
- Cantharellus cibarius* : Girolle, Chanterelle
- Cantharellus cinereus* : Chanterelle cendrée, Chanterelle grise
- Cantharellus friesii* : Girolle abricot
- Cantharellus subpruinosis = C pallens* : Girolle pruneuse
- Clitocybe nebularis* : Clitocybe nébuleux
- Clitocybe odora* : Clitocybe odorant
- Clitopilus geminus* : Rhodocybe tronqué
- Clitopilus prunulus* : Meunier, Clitopile petite-prune
- Coprinus disseminatus* : Coprin disséminé, Coprin grégaire
- Cortinarius alboviolaceus* : Cortinaire blanc-violet
- Cortinarius saturninus* : Cortinaire à chair violacée
- Cortinarius subferrugineus* : Cortinaire ferrugineux
- Cortinarius talus* : Cortinaire à talon
- Cortinarius trivialis* : Cortinaire trivial
- Cortinarius variicolor* : Cortinaire de couleurs variées
- Cortinarius violaceus* : Cortinaire violet
- Cortinarius xanthophyllus* : Cortinaire à lames jaunes
- Gomphidius glutinosus* : Gomphide glutineux
- Hebeloma mesophaeum* : Hébelome à centre sombre
- Hygrocybe conica* : Hygrophore conique
- Hygrophoropsis aurantiaca* : Fausse girolle, Clitocybe orangé

Hygrophorus eburneus : Hygrophore blanc d'ivoire
Hypholoma fasciculare : Hypholome en touffes
Laccaria amethystina : Laccaire améthyste
Lactarius aurantiacus : Lactaire fauve orangé
Lactarius circellatus : Lactaire cerclé
Lactarius deliciosus : Lactaire délicieux
Lactarius deterrimus : Lactaire des épicéas, Lactaire très mauvais
Lactarius lacunarum : Lactaire des boubiers
Lactarius luridus : Lactaire blafard
Lactarius picinus : Lactaire enfumé, Lactaire couleur de poix
Lactarius torminosus : Lactaire à toison
Lactarius trivialis : Lactaire trivial, Pisse-l'eau
Lactarius uvidus : Lactaire humide
Lactarius vellereus : Lactaire velouté
Lactifluus piperatus : Lactaire poivré
Lepiota cristata : Lépiote à crêtes
Lepiota subincarnata : Lépiote de Jossierand
Leucoagaricus leucothites : Morte de froid
Leucopaxillus gigantea : Leucopaxille géant
Lyophyllum decastes : Tricholome en touffes
Macrolepiota excoriata : Lépiote excoriée
Macrolepiota fuliginosa : Lépiote fuligineuse
Macrolepiota mastoidea : Lépiote mamelonnée
Macrolepiota procera : Coulemelle, Lépiote élevée
Marasmius oreades : Bouton de guêtre, Marasme des Oréades, faux-mousseron, Pradélet etc...
Megacollybia platyphylla : Collybie à larges lames
Mycena pura : Mycène pure
Mycena rosea : Mycène rose
Paxillus involutus : Paxille enroulé
Phyllotopsis nidulans : Crepidotus jonquille
Pluteus cervinus : Plutée couleur de cerf
Pluteus petasatus : Plutée en parasol
Pluteus plautus : Plutée de Boudier
Rhodocollybia butyraceae : Collybie beurrée
Russula cyanoxantha : Russule charbonnière
Russula heterophylla : Russule à lames fourchues
Russula mustelina : Russule belette

Russula pseudointegra : Russule coccinée
Russula rosea = *R. lepida* : Russule jolie
Russula velutipes : Russule aurore
Russula violeipes : Russule à pied violet
Russula virescens : Russule verdoyante, Palomet
Thelephora terrestris : Théléphore terrestre
Tricholoma album : Tricholome blanc
Tricholoma batschii : Tricholome à pied bicolore, Tricholome rompu
Tricholoma columbetta : Tricholome colombette
Tricholoma populinum : Tricholome des peupliers
Tricholoma sciodes : Tricholome gris perfide
Tricholoma ustale : Tricholome brûlé
Tricholomopsis rutilans : Tricholome rutilant

Champignons à tubes :

Boletus edulis : Cèpe de Bordeaux
Boletus ferrugineus : Bolet ferrugineux
Boletus pinophilus = *B. pinicola* : Cèpe des pins
Boletus subtomentosus : Bolet subtomenteux
Caloboletus calopus : Bolet à beau pied
Chalciporus piperatus : Bolet poivré
Imleria badia : Bolet bai
Leccinum aurantiacum : Bolet orangé des chênes
Leccinum holopus : Bolet blanc de neige
Leccinum pseudoscabrum = *L. carpini* : Bolet rude des charmes
Leccinum scabrum : Bolet rude
Leccinum versipelle = *L. testaceoscabrum* : Bolet roux
Neoboletus erythropus : Bolet à pied rouge
Rheubarbariboletus armeniacus : Bolet abricot
Suillellus queletii : Bolet de Quélet
Suillus bovinus : Bolet des bouviers
Suillus luteus : Nonnette voilée
Xerocomellus chrysenteron : Bolet à chair jaune
Xerocomellus porosporus : Bolet fissuré
Xerocomellus pruinatus : Bolet pruineux

Polypores :

- Cerioporus varius* = *Polyporus varius* : Polypore variable
Fomitopsis pinicola : Polypore marginé
Heterobasidium annosum : Polypore des pins
Piptoporus betulinus : Polypore du bouleau
Polyporus brumalis : Polypore d'hiver
Postia simanii : Pas de nom commun connu
Trametes versicolor : Coriole, Polypore ou Tramète multicolore

Autres :

- Apioperdon pyriforme* = *Lycoperdon pyriforme* : Vesse-de-loup en poire
Bovista plumbea : Boviste couleur de plomb
Calvatia utriformis : Calvatie en outre
Clavariadelphus pistillaris : Clavaire en pillon
Hericiium cirrhatum : Hydne frisé
Lycoperdon echinatum : Vesse-de-loup épineuse
Lycoperdon mammiforme : Vesse-de-loup voilée
Lycoperdon perlatum : Lycoperdon perlée
Otidea onotica : Oreille-de-lièvre
Ramaria flavobrunnescens : Ramaire brunissante
Sarcodon imbricatus : Hydne imbriqué
Scleroderma citrinum : Scléroderme commun
Vascellum pratense = *Lycoperdon pratense* : Vesse-de-loup à diaphragme

Le week-end s'est déroulé dans de bonnes conditions climatiques. Température très douce le samedi, plus fraîche le dimanche matin, avec l'apparition de la pluie de 11h à midi. Le soleil est revenu ensuite pour le déjeuner.

L'espèce dominante récoltée a été le cèpe des pins (excellent comestible), ce qui a contribué à la réussite de cette sortie.